



Bulletin de Santé du Végétal

16 juin 2009 - N° 15

Arboriculture



POMMIER- POIRIER

Tavelure : taches sur fruit

Carpocapse : vol continu

POIRIER

Psylles : adultes

PRUNIER

Carpocapse : vol ralenti

CERISIER

Mouche : vol ralenti

Moniliose : risque

Pommier-Poirier

Tavelure

Situation actuelle

Des taches parfois nombreuses sont observées sur les fruits.

Evolution du risque

Les repiquages sont possibles à chaque période humide uniquement dans les parcelles contenant des taches. Les prochaines pluies sont annoncées pour le week-end. Inspecter attentivement les parcelles autant le feuillage que les fruits.

Carpocapse des pommes

Situation actuelle

Les captures fluctuent avec la courbe des températures et plusieurs pièges connaissent des captures régulières. Dans notre réseau, seuls les 3 pièges suivis à Rottelsheim ne révèlent pas de fortes captures depuis le début de saison.

Concernant les dégâts en parcelles, très peu de perforations sont observées sur l'ensemble de la région. Les larves font environ 5 mm actuellement.

Evolution du risque

Poursuivre la surveillance des pièges mais aussi des dégâts, particulièrement en zone confusée. Garder la même famille chimique lors du renouvellement de la protection.

Capua

Situation actuelle

Quelques captures sont encore en cours.

Evolution du risque

Maintenir la surveillance même si le pic de vol est dépassé. Les conditions météorologiques sont favorables jusqu'à la prochaine perturbation.

Pommier

Maladie de la suie et de la crotte de mouche

Evolution du risque

La perturbation annoncée pour le week-end pourrait être favorable aux contaminations.

Pucerons

Situation actuelle

Les foyers de pucerons cendrés sont toujours très présents.

Evolution du risque

Les conditions poussantes sont toujours favorables au développement des colonies de pucerons.

Poirier

Psylles

Situation actuelle

Les adultes de la troisième génération sont visibles.

Evolution du risque

Les générations vont se succéder au cours de l'été avec la présence simultanée de tous les stades du psylle.

Prunier

Carpocapse des prunes

Situation actuelle

Les captures sont toujours faibles.

Evolution du risque

Surveiller les pièges.

Cerisier

Mouche de la cerise

Situation actuelle

Après le pic de début juin, les captures ont diminué. Seul un piège de notre réseau a connu un pic décalé entre le 8 et le 15 juin.

Evolution du risque.

Le risque majeur est passé dans la majorité des situations.

Moniliose

Situation actuelle

Les premiers symptômes sont visibles.

Evolution du risque.

Le risque de contamination est réel pour les variétés qui vont arriver à maturité.