



Retour de la pluie. Nouveau vol du thrips tabaci. Poursuite du vol de la mouche mineuse du poireau. Aleurode sur chou de Milan.

SOMMAIRE

△ **Alliacées et choux :**

nouveau vol du thrips tabaci

△ **Alliacées :**

mouche mineuse du poireau

△ **Chou :**
aleurodes sur chou de Milan

Allium

Teigne du poireau

Pas de capture sur les 2 sites du SRAL.

Mouche mineuse du poireau

Le vol se poursuit. Des dégâts de mineuses sont observés à Obenheim sur poireau bio (intensité faible pour le moment).

Choux

Aleurode

Des aleurodes sont observées sur les choux de Milan en particulier.

Ombellifères

Mouche de la carotte

Pas de nouvelle capture.

Allium et chou

Thrips tabaci

Un nouveau vol a eu lieu en secteur précoce sur Obenheim et Obersaasheim, en secteur intermédiaire sur Sessenheim et Wiwersheim. Le thrips est encore très actif sur les choux à choucroute notamment.

Voici la situation des vols :

Régions agricoles classées par secteur de précocité	Station météo correspondante	Nombre de vol de thrips passé au 07/10/09
Secteur précoce		
PIEMONT VOSGIEN ET VIGNOBLES	Sigolsheim	11
	Scherwiller	11
	Wolxheim	10
PLAINE D'OVERNAI	Obernai	11
HARDT	Obersaasheim	11
Secteur intermédiaire		
PLAINE DE BRUMATH	Vendenheim	10
RIED NORD	Sessenheim	10
ACKERLAND –KOCHERSBERG	Wiwersheim	10
PLAINE DE L'ILL	Rouffach	10
RIED SUD	Marckolsheim	9
COLLINES DE BRUMATH	Rottelsheim	9
Secteur tardif		
ALSACE BOSSUE	Lorentzen	8
OUTRE FORET	Wissembourg	9
SUNDGAU	Altkirch et Geispitzen	9
OCHSENFELD	Wuenheim	10
PAYS DE HANAU	Uhrwiller	9